



TUTORAT UE 5 2014-2015 – Anatomie

CORRECTION Séance n°7 – Semaine du 16/03/2015

Appareil digestif Pr Prudhomme

QCM n°1 : B, (E)

- A. Faux. Pas sur sa partie postérieure, c'est l'aréanuda.
- B. **Vrai.**
- C. Faux. Ceci est visible sur la coupe para sagittale gauche de la cavité péritonéale.
- D. Faux. Ceci est visible sur la coupe para sagittale gauche de la cavité péritonéale.
- E. **Vrai. ANNULE**

QCM n°2 : A, E

- A. **Vrai.**
- B. Faux. La portion thoracique est la plus longue (cervicale=5cm, abdominale=3cm, thoracique= 17cm)
- C. Faux. On retrouve la portion cervicale de l'œsophage en regard des vertèbres C6 à TH2.
- D. Faux. La membrane phréno-oesophagienne est formée par la séreuse qui entoure la partie abdominale de l'œsophage, c'est la seule partie péritonisée.
- E. **Vrai.**

QCM n°3 : B, C, E

- A. Faux. Elle est antérieure, l'œsophage étant situé en arrière de la membrane trachéale, et dévié légèrement à gauche.
- B. **Vrai.**
- C. **Vrai.**
- D. Faux. C'est le nerf laryngé récurrent et non le X gauche.
- E. **Vrai.**

QCM n°4 : B, C, D

- A. Faux. Veine cave supérieure.
- B. **Vrai.**
- C. **Vrai.**
- D. **Vrai.**
- E. Faux. A ce niveau, le nerf X gauche devient antérieur à l'œsophage.

QCM n°5 : F

- A. Faux. Il est recouvert par l'auvent costal et le foie.
- B. Faux. Situé en dessous du diaphragme.
- C. Faux. Ce sont deux parties différentes : la poche à air est bien située à la partie supérieure mais l'antrum pylorique est située à la partie distale.
- D. Faux. Il s'agit de l'incisure angulaire, l'angle de His correspond à un épaississement de la muqueuse formant un clapet entre l'œsophage et l'estomac.
- E. Faux. Il s'agit de l'angle de His, la ligne Z correspond à un changement de muqueuse entre l'œsophage et l'estomac.

QCM n°6 :A

- A. **Vrai.**
- B. Faux. L'artère gastrique droite provient de l'artère hépatique propre.
- C. Faux. L'artère splénique vient du tronc cœliaque, elle donne bien l'artère gastrique postérieure pour la face postérieure du fundus, et donne aussi l'artère gastro-omentale gauche.
- D. Faux. La grande courbure est vascularisée par les artères gastro omentale droite (provient de l'artère gastro duodénale) et gauche (provient de l'artère splénique). ;
- E. Faux. L'arcade de la grande courbure est formée par la réunion des artères gastro omentales droite et gauche.

QCM n°7 :A, B, D

- A. **Vrai.**
- B. **Vrai.**
- C. Faux. Attention au sens : la veine gastro omentale gauche se jette dans la veine splénique.
- D. **Vrai.**
- E. Faux. Le tronc gastro-colique reçoit bien la veine gastro-omentale droite mais, il se jette dans la veine mésentérique supérieure.

QCM n°8 :F

- A. Faux. Les quelques centimètres suivant le pylore (=bulbe duodénal) sont mobiles, il est ensuite accolé à la paroi abdominale.
- B. Faux. Au niveau de D2.
- C. Faux. artère (et veine) mésentérique SUPÉRIEURE.
- D. Faux. Il est suivi du jéjunum.
- E. Faux. Ce ligament n'existe pas, la tête du pancréas est enchâssée dans le duodénum.

QCM n°9 :A, E

- A. **Vrai.**
- B. Faux. Le bloc duodéno-pancréatique est postérieur.
- C. Faux. Le bloc duodéno-pancréatique est intra péritonéal, l'aorte et la veine cave inférieure sont bien rétro-péritonéales.
- D. Faux. Rein gauche.
- E. **Vrai.**

QCM n°10 :A, D

- A. **Vrai.**
- B. Faux. Elle est formée par la réunion du canal cholédoque et de Wirsung.
- C. Faux. Il s'agit de fibres musculaires entourant l'ampoule, chaque canal est entouré d'un sphincter propre avant de former l'ampoule.
- D. **Vrai.** Plus spécifiquement au bord médial de la portion D2 du duodénum.
- E. **ANNULE**

QCM n°11 :F

- A. Faux. L'intestin grêle est composé de deux parties : le jéjunum et l'iléon. Le duodénum ne fait pas partie de l'intestin grêle.
- B. Faux. Il est bien rattaché à la paroi postérieure, mais il est mobile.
- C. Faux. Le diverticule de Meckel, quand il existe, est à environ 80cm de la jonction iléo-caecale, et correspond à la jonction entre la branche crâniale et la branche caudale de l'intestin moyen.
- D. Faux. L'intestin grêle est principalement vascularisé par l'artère mésentérique supérieure.
- E. Faux. L'artère récurrente (branche de l'artère iléo-colique) vascularise une partie de l'iléon.

QCM n°12 :C, D, E

- A. Faux. Il manque le colon sigmoïde et l'appendice vermiforme.
- B. Faux. Les tænias convergent vers l'appendice vermiforme.
- C. **Vrai.**
- D. **Vrai.**

E. **Vrai.** L'insertion du méso-colon transverse passe devant D2, devant le pancréas et longe le bord inférieur de la queue du pancréas.

QCM n°13 :A, B, D

- A. **Vrai.**
- B. **Vrai.**
- C. Faux. Ce sont des collatérales de l'artère mésentérique inférieure.
- D. **Vrai.**
- E. Faux. Les veines coliques gauches donnent la veine mésentérique inférieure.

QCM n°14 :B, C

- A. Faux. Il s'agit du fascia du Toldt.
- B. **Vrai.** Ce sont les ligaments phrénico-coliques, reliant chaque courbure colique au diaphragme.
- C. **Vrai.**
- D. Faux. Il est en rapport à gauche avec la rate et la queue du pancréas.
- E. Faux. Il s'agit d'un rapport indirect, entre ces deux structures anatomiques se trouve le duodénum.

QCM n°15 :B, D

- A. Faux. Elle se fait au regard de la vertèbre L1. Au regard de L4 se trouve la division de l'aorte abdominale.
- B. **Vrai.**
- C. Faux. Elle naît en arrière du pancréas, puis passe en avant du processus unciné.
- D. **Vrai.** L'anastomose se fait via l'arcade marginale.
- E. Faux. Elle se termine au regard de la jonction branche crâniale et branche caudale de l'intestin moyen.

QCM n°16 :C

- A. Faux. La ligne pectinée sépare la muqueuse glandulaire de la muqueuse épithéliale. Ces deux parties sont séparées par la ligne ano-rectale.
- B. Faux. La majeure partie est sous-péritonéale.
- C. **ANNULE**
- D. Faux. L'uretère. Le reste de l'item est vrai.
- E. Faux. Au contraire il ne possède ni bosselures ni taenias.

QCM n°17 :C, E

- A. Faux. C'est l'artère iliaque interne. Le reste de l'item est vrai.
- B. Faux. Il s'agit de l'artère SACRALE médiane (L'artère rectale médiane n'existe pas). Le reste de l'item est vrai.
- C. **Vrai.** L'artère rectale supérieure est une terminale de l'artère mésentérique inférieure, qui est impaire. Elle donne deux branches.
- D. Faux, l'artère rectale inférieure est la terminale de l'artère pudendale.
- E. **Vrai.**

QCM n°18 :B, C, E

- A. Faux. Il s'agit du septum recto-vaginal qui sépare le rectum de l'utérus.
- B. **Vrai.**
- C. **Vrai.**
- D. Faux. Le cul de sac recto prostatique est un repli de péritoine (qui est une séreuse et non une membrane fibreuse).
- E. **Vrai.**

QCM n°19 :C

- A. Faux. Il est effectivement dans l'hypochondre droit, donc il n'est pas palpable.
- B. Faux. Il est entouré de péritoine viscéral (capsule de Glisson) sauf au niveau de l'aréanuda (portion non péritonisée)
- C. **Vrai.**

- D. Faux. C'est le foie droit qui est composé de 4 segments (=division fonctionnelle), et non le lobe droit (=division anatomique), qui lui comprend le foie droit et une partie du foie gauche.
- E. Faux. Seules les veines hépatiques assurent le drainage vasculaire du foie, la veine porte perfuse le foie.

QCM n°20 :A, D

- A. **Vrai.**
- B. Faux. Voie biliaire accessoire=vésicule biliaire.
- C. Faux. Canal cholédoque
- D. **Vrai.** C'est l'entrée dans la bourse omentale.
- E. Faux. Il s'agit du pancréas (5) et du processus unciné (6).